

CONTROL DE LA TRISTEZA DEL AGUACATERO OCASIONADO POR *Phytophthora cinnamomi*.

1.- Realizar un picado de las raíces de los arboles, ya sea con equipo mecánico o en forma manual, aprovechando para hacer cajetes nuevos. Aplicando los siguientes productos: 50 ml. de PROTECTOR, 30 ml. de ALZIM y 200 ml. de RAIZ-FLORACION, por árbol, utilizando el equipo de fumigación normal, solamente quitándole la boquilla a la pistola y dirigiendo la aplicación desde el tronco del árbol y parte del cajete.



2.- Después de realizar un muestreo a los 20 a 25 días después de la aplicación para observar si se están formando nuevas raíces, se realiza el segundo tratamiento con los siguientes productos: 50 ml. de PROTECTOR, 30 ml. de ALZIM y 200 ml. de RAIZ-FLORACION



3.- Pasados 20 a 25 días, nuevamente se realizan muestreos para observar el desarrollo de las nuevas raíces, realizando la aplicación del siguiente tratamiento: 50 ml. de TRICHOR, 40 ml. de BASUB por árbol.

4.- Después de haber realizado el tercer tratamiento a los 20 a 25 días nuevamente se realiza el cuarto tratamiento con los siguientes productos: 50 ml. de TRICHOR, 40 ml. de BASUB por árbol.

RESULTADOS OBTENIDOS 9 MESES DESPUES DE REALIZADO EL PRIMER TRATAMIENTO EN LA HUERTA "LA AÑILERA I" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO

